Transfusionsmedizinische Relevanz von Autoantikörpern

Arbeitskreis Hämotherapie 26.09.2025

DRK-Blutspendedienst Nord-Ost

gemeinnützige GmbH

Institut für Transfusionsmedizin Dresden

Blasewitzer Straße 68/70

01307 Dresden

Dr. med. Franziska Paul

Kälte- vs. Wärmereaktive Autoantikörper

- Bedeutung von Autoantikörpern in der Transfusionsmedizin: AIHA
- Fallbeispiele
- Ziel: Unterschiede KAAK vs. WAAK praxisnah darstellen

Kälteautoantikörper (KAAK)

Pathophysiologie	Primär vs. sekundär Infekte (Mykoplasmen, EBV) → akut idiopathisch, Lymphoproliferation → chronisch
Temperaturbereich	reaktiv bei < 30 °C
AIHA	Hämolyse mild, oft kompensiert (intravasal durch Komplement)
Klinische Chemie	Bilirubin (↑), LDH ↑
Immunhämatologie	DAT meist C3d + , IgM-vermittelt
Transfusionsrelevanz	Störung serologischer Tests, Blutwärmer, Bedside-Material

Wärmeautoantikörper (WAAK)

primär: idiopathisch (50%), genetisch (HLA-DQ6)
sekundär: Autoimmunerkrankungen (RA, SLE),
Lymphoproliferation, **Medikamente!**, Virusinfekte

reaktiv bei 37 °C

schwere Hämolyse möglich (extravasal)

Bili ↑, LDH ↑, Haptoglobin ↓, Hb ↓

DAT meist **IgG +**, C3d + möglich

Kreuzprobe schwierig, Allo-AK müssen
ausgeschlossen werden, aufwendige
immunhämatologische Diagnostik, Risikotransfusion

Direkter Antihumanglobulintest (DAT)/ Direkter Coombs (DCT)

... dient dem Nachweis von Antikörpern (Auto- und Allo-Ak) und Komplementfaktoren, die sich in vivo an die Patientenerythrozyten gebunden haben

DAT

Antihumanglobulin

IgM

- kältereaktiv
- ↑ Komplementaktivierung
- Pentamer
- komplette Antikörper

IgG

- wärmereaktiv (37°C)
- Kaum Komplementaktivierung
- Monomer
- inkompletter Antikörper

Intravasal

Komplementaktivierende Antikörper (zB. ABO-Inkompatibilität, KAAK) führen zur Schädigung der Erythrozytenmembran → einer Permeabilitätsstörung mit Austritt zytoplasmatischer Bestandteile und konsekutivem Untergang der Zelle

Extravasal

IgG1- und/oder IgG3-Antikörper vermitteln eine Opsonierung der Erythrozyten, mit oder ohne begleitende Komplementaktivierung, gefolgt vom Abbau durch intrahepatische Makrophagen oder splenische mononukleäre Zellen

Kälteautoantikörper

- BG: oft nicht bestimmbar
- AKS +/-
- **DAT positiv, va. C3d**
- ELUAT: negativ

Wärmeautoantikörper

- BG: keine Probleme
- AKS, AKDIFF positiv
- **DAT positiv, va. IgG** → Titer → Hämolyserisiko
- ELUAT: positiv

1. Hinweis

Patient: W, *18.03.1949, CAD

nativ

→ Blutgruppenbestimmung und AKS IAT Gelkarte bei KAAK erschwert

ZIEL: Ablösen von Autoantikörpern, die bei Temperaturen < 30 °C an Ery's binden und die immunhämatologischen Ergebnisse stören, AKS ohne Autoantikörper zum Identifizieren von Allo-Ak

Endbefund:
 Patient: W, *18.03.1949, CAD
 B RhD negativ
 → starke Kälteautoantikörper nachweisbar (passend zur Diagnose CAD)
 → C3d weist Komplementaktivierung nach
 → Derzeit keine Allo-Ak nachweisbar

Patient: M, *20.06.1951, gepl. Osteosynthese, bekannte KAAK

nativ

Nach Ablösung der KAAK

→ AKS u AKDIFF sieht nativ und nach Ablösung der KAAK spezifisch aus
 → In BioRad Standard 11er Panal Gelkarte kein eindeutiges Ergebnis

3-Stufen Röhrchentest

	Donor- No.	Rh- Typ	Rh-hr					Kell					Duffy		Luth- eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**	Test Results Ergebnisse						
			D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Lu ^a	Lu ^b	Jk ^a	Jk ^b	M	N	S	s	Le ^a	Le ^b	P ₁	Xg ^a	Co ^a	Co ^b		Di ^a	Di ^b	RT	4	3	CE	
1	904745	R ₁ R ₁	+	+	o	o	+	o	+	+	o	+	nt	nt	o	+	o	+	+	o	+	o	+	o	+	+	+	nt	nt	nt	nt		1	-	4	-	-	3
2	904746	R ₂ R ₂	+	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	nt	o	+	o	+	+	o	+	o	+	+	o	o	o	o	nt	nt	nt	nt		2	1	4	-	-	3
3	904747	R ₁ ^w R ₁	+	+	o	o	+	o	+	o	+	nt	nt	+	+	o	+	+	+	+	o	+	+	o	o	o	nt	nt	nt	nt		3	1	4	-	-	3	
4	904748	R ₀ r	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	nt	+	o	+	+	+	o	+	o	+	+	o	+	nt	nt	nt	nt		4	2	4	-	-	3	
5	904752	r'r	o	+	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	nt	+	o	o	+	+	+	+	o	o	+	o	+	nt	nt	nt	nt		5	2	4	-	-	3	
6	903637	r'r	o	o	+	+	+	o	o	+	o	+	nt	+	o	+	o	+	o	+	+	+	+	o	+	o	+	nt	nt	nt	nt		6	2	4	-	-	3
7	904751	rr	o	o	o	+	+	o	o	+	+	+	nt	nt	+	+	o	+	o	+	o	+	+	+	o	+	nt	nt	nt	nt		7	2	4	-	-	3	
8	600302	rr	o	o	o	+	+	o	+	o	o	+	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	o	nt		8	3	4	-	-	3	
Autocontrol																												2	4	-	-	2						
+y(a) +																											3	-	-	3								
Fy(a) -																											-	-	-	3								

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment. Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH
 Industriestr. 1, D-63303 Dreieich, Germany
 Tel.: +49-6103-3130-0, Fax: +49-6103-3130-724
 www.bio-rad.com, techsupport.bmd@bio-rad.com

** Donors are tested for HLA Class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. Positive reactions are reported accordingly. / Die Spender wurden mit einem monoklonalen Anti-HLA Class I Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet. Positive Reaktionen sind entsprechend ausgewiesen.

++ = positive positiv 0 = negative negativ nt = not tested nicht getestet w = weak schwach a = strong stark

Fy(a) + / vorgetestet →

KP 385	3	-	-	3
KP 195	3	-	-	3
KP 401	3	-	-	3

CE 023

Endbefund:

- Patient: M, *20.06.1951, gepl. Osteosynthese, bekannte KAAK
- NEU! **Anti-Fy(a)** im IAT → zeitlebens beachten (Nothilfepass)
- zusätzlich (bekannte) **Kälteautoantikörper** (passager)
- Transfusion über Blutwärmer, Bedside-Test Material vorwärmen
- Verlängerte Bearbeitungszeit für Konservenbereitstellung beachten

Konservenauswahl: B Rh D negativ ccddee, Kell negativ, Fy(a) negativ

(Kaukasische Bevölkerung)

B ccddee

Häufigkeit ca. 2 %

Kell neg.

Häufigkeit ca. 91 %

Fy(a) negativ

Häufigkeit ca. 34 %

Ca. 5 von 1000 EK's

Labor:

- Längere Bearbeitungszeit im Labor nötig
- Blutgruppenserologie erschwert
- Kreuzproben meist auch positiv wenn AKS stark positiv

Klinik/Praxis:

- Bedside Test Materialien vorwärmen
- Transfusion über Blutwärmer empfohlen (zert. Medizinprodukt!)
- Patient vor Kälteexposition bewahren
- OP Temperatur individuell anpassen

Pat: M, 25.04.1946, CLL, Urothel-Ca

Titer 1:1000, IgG1 und IgG3 → hohes Hämolyserisiko (abhängig von Anzahl gebundene IgG/Ery, va. IgG1 und IgG3)

AKS und AKDIFF nativ IAT

→ Kein Ausschluss von Allo-Ak möglich!!

DAT Abklärung - Säureelution

→ WAAK gebunden (ELUAT) und frei (IAT nativ) nachweisbar

Kontakt mit Klinik:

- Nachweis freier und gebundener Autoantikörper vom Wärmetyp!
- Aktuell kein Ausschluss von Allo-Ak möglich
- **Anamnese:** Grunderkrankung, Medikamente, Transfusion, Hämolyseparameter

Risikotransfusion im Vergleich zur EK bei vitaler Indikation

EK

KP

KP

+++

++

++

Vorteil:

- EK's schnell verfügbar

Nachteil:

- Transfusion langsam unter ärztlicher Aufsicht
- Kontrolle der Hämolyseparameter, Risiko für (verzögerte) hämolytische Transfusionsreaktion, da Allo-Ak nicht vorher ausgeschlossen wurden

Endbefund:

- Risikotransfusion, Kreuzproben positiv bei eingeschränkter Beurteilbarkeit aufgrund von WAAK, verträglich im Vergleich zur Eigenkontrolle
- Notwendige Transfusionen sollten Patienten nicht vorenthalten werden, aber langsam unter klinischer Kontrolle und Hämolysekontrolle durchgeführt werden
- Bei anhaltendem Transfusionsbedarf PCR transfusionsrelevanter Ag empfohlen

Weitere serologische Diagnostik (Adsorption):

→ zeitaufwendig und limitiert durch Materialmenge und ggf. Vortransfusion
(Voraussetzung: leere Immunisierungsanamnese < 3 Mo)

AKS nach Adsorption IAT 01/2025

→ Keine Allo-Ak im IAT nachweisbar
→ KP mit Adsorbat verträglich

AKS nach Adsorption IAT 09/2025

→ AKDIFF IAT mit Adsorbat

AKDIFF IAT mit Adsorbat

+ +/-* - + + - - - - + +

Rh-hr	Möglicher Genotyp Probable Genotype	Spender Donor Donneur Donatore Donante Dador	Rh-hr						Kell				Duffy		Kidd		Lewis		P	MNS				Luth.		Xg	Spez. Antigene Special types Antigeni particolari Otros Antígenos Tipos especiales	Res. Result LISS/ Coombs	Adsorbat	ult./ tato/ ultado	4°C		
			D	C	E	c	e	C*	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Le ^a	Le ^b	P ₁	M	N	S	s	Lu ^a						Lu ^b	Xg ^a
1	CCC*D.ee	R ₁ ^m R ₁	692962	+	+	0	0	+	+	0	+	0	+	0	+	0	0	+	+	+	0	0	+	0	+	+	N/A	1	2	1			
2	CCD.ee	R ₁ R ₁	854897	+	+	0	0	+	0	+	+	0	+	nt	nt	0	+	+	+	+	0	0	+	+	+	0	0	+	+	N/A	2	(+)	
3	ccD.EE	R ₂ R ₂	014109	+	0	+	+	0	0	0	+	0	+	nt	nt	0	+	0	+	0	0	+	+	+	0	+	0	+	+	N/A	3	2	-
4	Ccddee	r ⁻ r	710975	0	+	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	0	+	+	0	0	+	0	0	+	0	+	+	N/A	HLA+*	4	2	1	
5	ccddEe	r ⁻ r	501474	0	0	+	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	+	0	+	0	+	0	+	0	+	+	+	nt	N/A	HLA+*	5	1	1	
6	ccddee	rr	961562	0	0	0	+	+	0	+	+	0	+	nt	nt	+	+	0	+	0	+	+	0	+	0	0	+	nt	N/A	6	2	-	
7	ccddee	rr	879977	0	0	0	+	+	0	0	+	+	+	nt	nt	0	+	0	+	0	+	0	+	0	+	nt	N/A	7	1	-			
8	ccD.ee	R ₀ r	646079	+	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	0	0	+	+	0	+	+	+	+	+	0	+	0	N/A	8	2	-	
9	ccddee	rr	461788	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	+	+	0	+	0	+	0	+	0	0	+	+	N/A	9	1	-		
10	ccddee	rr	916834	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	+	0	+	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	N/A	10	2	1	
11	ccddee	rr	252075	0	0	0	+	+	0	0	+	0	+	nt	nt	0	+	+	0	0	+	0	+	0	+	+	nt	N/A	11	1	1		

Allo-Anti-Jk(a) nach Adsorption der Auto-Ak nachweisbar!

→ Kreuzprobe mit Autoadsorbat verträglich, EK Jk(a)-negativ

Endbefund:

- WAAK gebunden (ELUAT) und frei (IAT nativ) nachweisbar
 - transfusionsrelevant wenn auch frei nachweisbar, da AKS und KP positiv
 - Kein Nothilfepass, da passager
- DAT: hohes Hämolyserisiko für Patienten-/Fremderythrozyten → Kontrolle Hämolyseparameter
- Zusätzlich transfusionsrelevanter Allo-Ak Anti-Jk(a) nachweisbar → Nothilfepass erforderlich!
- PCR bei langfristigem Transfusionsbedarf empfohlen
- Kreuzprobe mit Autoadsorbat verträglich, EK Jk(a)-negativ

Vorteil:

- Ausschluss/Nachweis transfusionsrelevanter Allo-Ak möglich

Nachteil:

- zeitaufwendig (6-8 h nach Probeneingang im Labor)
- Untersuchungsmaterial: 20 ML EDTA und 10 ML NATIV, bei ausgeprägten AIHA bereits niedriger Hb
- meist neue Blutabnahme erforderlich → Zeit!?

Bei bekannter Immunisierungsanamnese < 3 Monate PCR der transfusionsrelevanten Antigene / zusätzlich nach Risikotransfusion im Vgl. zur EK / bei langfristigem Transfusionsbedarf

Vorteil:

- Falls Allo-Ak vorhanden keine Boosterung/Bindung an transfundierte Ery's, wenn antigengerechte EK's bereitgestellt werden
- beugt Alloimmunisierung vor, Ergänzung bei anhaltendem Transfusionsbedarf

Nachteil:

- Keine Cito Methode, Mo-Fr Ansatz bis 11:00, PCR Ergebnis ca. 4 h

Befund:

Methode: PCR-SSP

Antigene negativ: K, Jk(a), Fy(b), M

Antigene positiv: k, Jk(b), Fy(a), N, S, s

→ EK's antigengerecht ausgewählt

- ✓ Im Notfall ist eine Kombination mehrerer Methoden die beste Lösung
- ✓ Bei Risikotransfusion sollte im besten Fall **vor Dieser** noch das Blut für die Adsorption abgenommen werden → Folgebefund nach Adsorption (Adsorption nicht möglich nach Trafu < 3 Mo)
- ✓ PCR ist immer mit EDTA möglich (wenn genug kernhaltige Zellen in Vollblut für DNA)
- ✓ WAAK kommen nicht in den Nothilfepass (passager, frei u/o gebunden)

Hinweis: WAAK die nur gebunden nachweisbar sind erschweren die EK-Bereitstellung nicht, keine Absorptionsuntersuchung nötig, Ag müssen dann auch nicht berücksichtigt werden, da im IAT transfusionsrelevante AK ausgeschlossen werden können

- ✓ Autoantikörper können zu schweren hämolytischen Anämien führen
 - ✓ **Anamnese**
 - ✓ Autoantikörper erschweren die Labordiagnostik: **Bearbeitungszeit** ↑ (Ausschluss von Alloantikörpern notwendig, aufwendige Zusatzdiagnostik: Absorption (ca. 6 h), Elution, Spezialpanels, PCR)
 - ✓ WAAK meist Hb ↓ und dringende Transfusionsindikation
 - Risikotransfusion vs. Ag-gerecht bzw. negativer AKS nach Adsorption
 - ✓ KAAK va. im Labor und im prätransfusionellem Setting ein Problem
 - Blutwärmer und Bedside-Material vorwärmen
 - ✓ Ag-gerechte Versorgung beugt Alloimmunisierung vor und verhindert hämolytische TFR
 - ✓ Rücksprache mit der Transfusionsmedizin
- Evaluation spezifischer Therapie der AIHA → Verlaufskontrolle Hämolsyeparameter, DAT, Kältetiter

Begleitschein für Bluteinsendungen Immunhämatologisches Labor

DRK-Blutspendedienst Nord-Ost
gemeinnützige GmbH
Berlin | Brandenburg | Hamburg
Sachsen | Schleswig-Holstein

MVZ Ulm gGmbH
Zweigpraxis Dresden
Univ.-Prof. Dr. med.
Torsten Tonn
FA für Transfusionsmedizin
Blasewitzer Straße 68/70
01307 Dresden
Tel.: 0351 44508-118
Fax: 0351 44508-119

Institut Dresden
Blasewitzer Straße 68/70
01307 Dresden
Tel.: 0351 44508-830
Fax: 0351 44508-835
Institutsleiterin:
PD Dr. med. Kristina Höllg
Laborleiterin:
Dr. med. Elisabeth Urban

Blutspendezentrum Görlitz
Zeppelinstraße 43
02828 Görlitz
Tel.: 03581 3211-40
Fax: 03581 3211-45
Institutsleiterin:
PD Dr. med. Kristina Höllg
Laborleiterin:
Dr. med. Elisabeth Urban

!Y27670400300387

Auftragsnummer / Probenerfassung

Für Patient: (Name, Vorname, Geburtsdatum)

Geschlecht:

männlich

weiblich

Einsender (Stempel der Einrichtung)

Diagnose _____

Blutgruppe _____

Bekannte Antikörper _____

Medikamente _____

Vortransfusion: ja nein

wenn ja, zuletzt: _____

Schwangerschaft: ja nein

wenn ja, zuletzt: _____

Gerinnungshemmer: ja nein

allogene Stammzelltransplantation: ja nein

Material: EDTA-Blut Nativ-Blut Nabelvenenblut

Falls nicht anders angegeben bitte 8 ml EDTA-Blut einsenden!

Dringlichkeit der Anforderung: Routine CITO/Notfall*

* (bitte telefonische Anmeldung)