Sonderpräparate für spezielle klinische Indikationen

Gewaschene Erythrozytenkonzentrate

L. Trojanova
DRK-Blutspendedienst Nord-Ost
ITM Dresden

Sonderpräparate

- **Bestrahte zelluläre Blutprodukte**
 - zur Vermeidung einer ta-GvHD
 - durch Bestrahlung (30 Gy) Inhibition der T-Lymphozyten-Proliferation
 - Indikation zur Bestrahlung s. Querschnitts-Leitlinie zur Therapie mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten

- **Gewaschene Erythrozytenkonzentrate**

Für die kleinsten Patienten:

- Geteilte Blutprodukte (Erythrozytenkonzentrate, Thrombozytenkonzentrate) – „Baby-Eks“
- eingeeignetes Erythrozytenkonzentrat für intrauterine Transfusion (EK mit höherem Hämatokrit)
- Austauschtransfusion

DRK-Blutspendedienst Nord-Ost
gemeinnützige GmbH
Berlin | Brandenburg | Hamburg
Sachsen | Schleswig-Holstein

Deutsches
Rotes
Kreuz

Erythrozytenkonzentrate enthalten:

Erythrozyten (Hct. 50 – 70%, Hb > 40 g/Einheit)
Leukozyten < 1×10^6 /Einheit
Plasma 0,009 – 0,08 ml/ml Plasma
= 1 EK enthält ca. 2,7 – 24 ml/Einheit
Additivilösung (PAGGS-M)
Stabilisatorlösung (CPD – Citratlösung, u.a.)

Plasmaproteine in Blutprodukten können bei Empfängern akute
Transfusionsreaktion auslösen.

L. Trojanova AK Hämotherapie 26.09.2025 3

DRK-Blutspendedienst Nord-Ost
gemeinnützige GmbH
Berlin | Brandenburg | Hamburg
Sachsen | Schleswig-Holstein

Deutsches
Rotes
Kreuz

- Selektiver IgA-Mangel häufigster primärer Immundefekt
 - Prävalenz 1:200 – 1:700
 - Davon 1:1200 – 1:1600 entwickeln Anti-IgA
 - aber bei 76,3% Patienten mit IgA-Mangel und ATR wurden Anti-IgA nachgewiesen
 - im DRK-BSD Nord-Ost keine IgA-Mangel Bestimmung oder IgA-Antikörper Bestimmung möglich
- andere Plasmaproteine-Unverträglichkeit
- (Übertragung von Allergenen über Blutprodukte auf den Empfänger)

In der Regel handelt es sich um eine allergische Transfusionsreaktion
(andere akute Transfusionsreaktionen sollten ausgeschlossen werden –
Fehltransfusion, hämolytische TR, febrile nicht-hämolytische TR, TACO, TRALI)

L. Trojanova AK Hämotherapie 26.09.2025 4

DRK-Blutspendedienst Nord-Ost
gemeinnützige GmbH
Berlin | Brandenburg | Hamburg
Sachsen | Schleswig-Holstein

Deutsches Rotes Kreuz

Gewaschene Erythrozytenkonzentrate

- durch das „Waschen“ wird das Restplasma aus dem Erythrozytenkonzentrat entfernt
- nicht vorrätig
- Haltbarkeit 24 Std. ab Ende der Herstellung
- Spender werden nicht auf Ig-A Mangel untersucht
 - keine EKs und FFPs von Spendern mit Ig-A Mangel vorrätig
- gewaschene EKs werden nur patientenbezogen hergestellt
- CAVE Indikation für gewaschene EKs sorgfältig stellen, Risiko der Verzögerung oder Vermeidung einer lebensrettenden Transfusion!
- für Notfalltransfusionen haben wir keine geeigneten Blutpräparate zur sofortigen Verfügung
 - Transfusion mit Standard - EKs darf nicht verzögert oder vermieden werden, Monitoring des Patienten notwendig, Therapie einer anaphylaktischen Reaktion muss gewährleistet werden

L. Trojanova AK Hämotherapie 26.09.2025 6

Indikation für gewaschene Erythrozytenkonzentrate

Querschnitts-Leitlinie zur Therapie mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten 2020:

- Erythrozytenkonzentrate:
 - „Gewaschene EK sind nur bei Patienten indiziert, bei denen seltene transfusionsrelevante Antikörper gegen IgA oder andere Plasmaproteine nachgewiesen oder wiederholt schwere, nicht geklärte, nicht hämolytische Transfusionsreaktionen beobachtet wurden“
- Therapeutisches Plasma:
 - „Bei Plasmaunverträglichkeit und nachgewiesenem IgA-Mangel ist Therapeutisches Plasma kontraindiziert. Bei dem nicht seltenen hereditären IgA-Mangel (Prävalenz 1:650) können Anti-IgA-Antikörper vorliegen, die mit anaphylaktischen Reaktionen nach Applikation IgA-haltiger Blutprodukte in Verbindung gebracht wurden. Der Zusammenhang ist jedoch umstritten.“

Patienten mit bekanntem IgA-Mangel

(gemäß Guidelines der Britishen Society for Haematology 2023)

- Anamnese, Vortransfusion?, Transfusionsreaktion?
- IgA-Antikörper Bestimmung
- unauffällige Vortransfusion, keine IgA-Antikörper vorhanden
 - Transfusion mit Standard-EK möglich
- bekannte schwere allergische Reaktion nach Transfusion und/oder IgA-Antikörper nachweisbar
 - Indikation für gewaschene EKs
 - bei Notfalltransfusionen Transfusion mit Standard-EKs
 - (bei elektiven Eingriffen kann auch Eigenblutspende erwogen werden, MAT)

Herstellung

-

Gewaschene Erythrozytenkonzentrate

Gewaschene Erythrozytenkonzentrate

- EK wird mit isotonischer Lösung mehrmals gewaschen, dadurch wird das Restplasma entfernt. Anschließend wird Additivlösung zugegeben

Herstellung – 1. Waschgang

EK mit Additivlösung verbinden → Zugabe Additivlösung, Beutel abtrennen → gut schütteln

Herstellung – 1. Waschgang

EK mit Leerbeutel verbinden

Herstellung – 1. Waschgang

Herstellung – 1. Waschgang

Herstellung – 2. Waschgang

Zentrifugieren

Herstellung – 2. Waschgang

Spezifikationen

- Haltbarkeit 24 Std. ab Ende der Herstellung
- Hämatokrit 50 – 75%, gesamt Hb > 40 g/dl
- Hämolyserate < 0,8% der Erythrozytenmasse
- Gesamteiweiß < 0,5 g/Einheit

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

l.trojanova@blutspende.de